

VITE: avviso n° 09 del 28/07/2020

STADIO FENOLOGICO: INIZIO INVAIATURA

PERIODO DI RIFERIMENTO: 28/07/2020 – 07/08/2020

Le previsioni indicano tempo sereno con temperature massime ben oltre i 30° C.

FLAVESCENZA DORATA

E' necessario effettuare il secondo intervento insetticida per contenere l'insetto vettore *Scaphoideus titanus*. Si consiglia di impiegare un principio attivo diverso da quello impiegato per il primo trattamento, in particolare preferire prodotti con attività sistemica.

Intervenire con uno dei seguenti prodotti nel periodo compreso tra il 28 e 3 luglio:

PRINCIPIO ATTIVO	LIMITAZIONI NORME TECNICHE MISURA 10.1	CARENZA (gg)
ETOFENPROX	Max 1 trattamento/anno	21
TAU-FLUVALINATE	Max 1 trattamento/anno	21
ACETAMIPRID	Max 2 trattamenti/anno	14
FLUPYRADIFURONE	Max 1 trattamento/anno	14

ACCORGIMENTI

- Controllare il pH della soluzione in modo che sia inferiore a 7.
- Impiegare volumi di acqua e pressioni di distribuzione in grado di bagnare bene tutta la vegetazione.
- Trattare tutti i filari da entrambi i lati. Per Acetamiprid e Flupyradifurone preferire le ore fresche per trattare.
- Cercare di far arrivare la soluzione sulla pagina inferiore delle foglie, comprese quelle dei polloni.
- Evitare presenza di polloni o erbe infestanti troppo sviluppate alla base dei ceppi.
- **Dopo aver trattato con l'insetticida e trascorso il tempo di rientro (almeno 48 ore) eliminare i tralci con sintomi o capitozzare le piante malate senza attendere la vendemmia. In questo modo si eliminano le fonti di infezione.**

PERONOSPORA

Con l'aumento delle temperature dovrebbe arrestarsi lo sviluppo dell'infezione dell'inizio di luglio. Si consiglia comunque di ripristinare la copertura con prodotti rameici (Max 4 kg rame metallo/Ha all'anno). Nel caso la pressione della malattia sia elevata, in particolare nelle aree dove l'umidità rimane elevate nelle prime ore della giornata, si consiglia di addizionare

Fosetyl alluminio (28 gg di carenza)

Fosfonati di potassio(14 gg di carenza) max 5 trattamenti/anno

Fosfonato di disodio(21 gg di carenza) max 6 trattamenti/anno

Contattare il tecnico per altre situazioni particolari.

OIDIO

Si consiglia di intervenire con zolfo bagnabile per mantenere protetti i grappoli in queste ultime fasi sensibili. Se sono presenti attacchi, contattare il tecnico per concordare una strategia contenitiva.

BOTRITE

Per le varietà a vendemmia precoce (basi spumante, aromatici, vitigni bianchi, dolcetto, nelle situazioni più predisponenti l'insorgere della malattia, ovvero vigneti in aree particolarmente umide o con elevata vigoria oppure dove si siano verificate grandinate o attacchi di oidio rilevanti, si consiglia di intervenire con uno dei seguenti prodotti antibotritici:

PRINCIPIO ATTIVO	LIMITAZIONI NORME TECNICHE MISURA 10.1	CARENZA (gg)
FLUDIOXONIL + CIPRODINIL	Max 1 trattamento/anno	21
BOSCALID	Max 1 trattamento/anno	28
FENPIRAZAMINE	Max 1 trattamento/anno	14
FENEXAMIDE	Max 1 trattamento/anno	7

Prestare la massima attenzione al rispetto dei giorni di carenza, impiegando i principi attivi con carenza più breve in interventi antibotritici specifici più prossimi alla vendemmia. Per le varietà più tardive attendere ancora per l'intervento.

“Al fine di tutelare le api e gli altri insetti pronubi si ricorda quanto previsto dalla Legge Regionale 1/2019, Art. 96, comma 9. I trasgressori sono puniti con sanzioni fino € 1200,00.

Al fine di tutelare gli allevamenti apistici da sostanze tossiche, sono vietati i trattamenti antiparassitari con fitofarmaci ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura, dalla chiusura dei petali alla caduta degli stessi. I trattamenti sono, altresì, vietati se sono presenti secrezioni nettarifere extrafiorali su piante con presenza di melata o qualora siano in fioritura le vegetazioni sottostanti, tranne che si sia proceduto allo sfalcio di queste ultime ed all'asportazione totale delle loro masse, o si sia atteso che i fiori di tali essenze si presentino completamente essiccati in modo da non attirare più le api. I trattamenti specifici contro le malattie crittogramiche di colture erbacee, nonché contro le ticchiature delle pomacee e le moniliosi delle drupacee possono venire effettuati con prodotti selettivi, anche durante le fioriture, solamente nei casi di necessità accertati dalla struttura regionale competente in materia fitosanitaria.”

Controllare ed attenersi sempre alle limitazioni d'uso riportate in etichetta.

- Si ricorda di tenere aggiornato il quaderno di campagna.

Per informazioni:

Rosina Marco Tel: 0141-380408 - 3316572135 marco.rosina@coldiretti.it

14100 Asti – C.so F. Cavallotti, 41 – Tel 0141 38.04.00 – Fax 0141 35.51.38

Cap. Soc. € 13.737,57 (I. V.) – N. Reg. Impresa AT 2000/2041 – R.E.A. 99537 – C.F. / P.IVA 01238160053

CANELLI: Via Cassinasco, 11/13 - Tel. 0141/823590 • CASTELNUOVO D.B.: Via Viglione, 18 - Tel. 011/9876863 • MONCALVO: P.zza C.Alberto, 25 - Tel. 0171/916100 • NIZZA M.TO: Cso Acqui, 42/44 - Tel. 0141/721117 • SAN DAMIANO D'ASTI: Via Roma, 23 - Tel. 0141/971000 • VESIME: P.zza Vittorio Emanuele II, 3 - Tel. 0141/859801 • VILLANOVA D'ASTI: Via O. Blandino, 19 - Tel. 0141/946639