

VITE: avviso n° 10 del 03/08/2021

STADIO FENOLOGICO: INIZIO INVAIATURA
PERIODO DI RIFERIMENTO: 03/08/2021 – 11/08/2021

FLAVESCENZA DORATA

Intervenire con uno dei seguenti prodotti nel periodo compreso tra il 4 e 9 agosto:

PRINCIPIO ATTIVO	LIMITAZIONI NORME TECNICHE MISURA 10.1	TEMPO DI CARENZA (gg)
ETOFPENPROX	Max 1 trattamento/anno	21
ACETAMIPRID	Max 2 trattamenti/anno	7 -14 in funzione del formulato commerciale
FLUPYRADIFURONE	Max 1 trattamento/anno	14

La Flavescenza dorata della vite si previene solo se, dopo aver trattato con l'insetticida e trascorso il tempo di rientro (almeno 48 ore), si eliminano i tralci con sintomi o si capitozzano le piante malate senza attendere la vendemmia. Questo serve per togliere la fonte di fitoplasma che rende infettivo l'insetto vettore (scafoideo).

ACCORGIMENTI

- Controllare il pH della soluzione in modo che sia inferiore a 7.
- Impiegare volumi di acqua e pressioni di distribuzione in grado di bagnare bene tutta la vegetazione.
- Trattare tutti i filari da entrambi i lati. Per Acetamiprid e Flupyradifurone preferire le ore fresche per trattare.
- Cercare di far arrivare la soluzione sulla pagina inferiore delle foglie, comprese quelle dei polloni.
- Evitare presenza di polloni o erbe infestanti troppo sviluppate alla base dei ceppi.

VIGNETI ADIACENTI AD AREE FREQUENTATE DA GRUPPI VULNERABILI (punto A.5.6 del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari)

Nei vigneti a distanze inferiori a 10 metri da aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili (quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili ed aree verdi di plessi scolastici, parchi gioco, strutture sanitarie), devono essere adottati i seguenti accorgimenti:

- distribuire la miscela verso l'interno del vigneto
- utilizzare coadiuvanti antideriva
- non utilizzare cannoni per la distribuzione della miscela insetticida
- segnalare preventivamente alla popolazione l'esecuzione dei trattamenti con adeguata cartellonistica
- trattare nelle ore di minor frequentazione.

OIDIO

Si registrano sintomi diffusi sulle varietà sensibili, in particolare moscato, ma in quasi tutte le situazioni, l'infezione sembra essersi arrestata. Ripristinare la copertura antiodica con **ZOLFO BAGNABILE**

PERONOSPORA

Non si registrano particolari problematiche legate alla peronospora; nell'ultimo periodo numerosi fenomeni temporaleschi hanno stimolato la ripresa dello sviluppo vegetativo, soprattutto nelle zone più fresche. Si consiglia di ripristinare la copertura con **PRODOTTI RAMEICI (21 gg di carenza, max 4 kg/ha di rame metallo)**.

Sui vitigni a maturazione più tardiva, ripetere l'intervento a distanza di 10-12 gg se occorreranno nuove precipitazioni rilevanti nella seconda decade di agosto, indirizzando il trattamento nella parte alta della vegetazione.

In caso di situazioni particolari contattare il tecnico per concordare l'intervento.

BOTRITE

Per quei vigneti particolarmente suscettibili a causa della posizione, della vigoria o della sensibilità varietale oppure dove si sono avuti recentemente dei danni da grandine, si consiglia di intervenire nella fase di piena invaiatura, operando sulla fascia grappolo, con uno dei seguenti p.a. Porre attenzione ai tempi di carenza dei prodotti.

PRINCIPIO ATTIVO	LIMITAZIONI NORME TECNICHE MISURA 10.1	TEMPO DI CARENZA (gg)
FLUDIOXONIL + CIPRODINIL	Max 1 interventi/annuo	21
FENPIRAZAMINE	Max 1 interventi/annuo	14
ISOFETAMID	Max 1 interventi/annuo	21
FENEXAMIDE	Max 1 interventi/annuo	7
BICARBONATO DI POTASSIO		1

TIGNOLE

Non si registrano ancora catture relative al volo degli adulti di terza generazione. Attendere per intervenire.

“Al fine di tutelare le api e gli altri insetti pronubi si ricorda quanto previsto dalla Legge Regionale 1/2019, Art. 96, comma 9. I trasgressori sono puniti con sanzioni fino € 1200,00.

Al fine di tutelare gli allevamenti apistici da sostanze tossiche, sono vietati i trattamenti antiparassitari con fitofarmaci ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi. I trattamenti sono, altresì, vietati se sono presenti secrezioni nettarifere extrafiorali su piante con presenza di melata o qualora siano in fioritura le vegetazioni sottostanti, tranne che si sia proceduto allo sfalcio di queste ultime ed all'asportazione totale delle loro masse, o si sia atteso che i fiori di tali essenze si presentino completamente essiccati in modo da non attirare più le api. I trattamenti specifici contro le malattie crittogramiche di colture erbacee, nonché contro le ticchiolature delle pomacee e le moniliosi delle drupacee possono venire effettuati con prodotti selettivi, anche durante le fioriture, solamente nei casi di necessità accertati dalla struttura regionale competente in materia fitosanitaria.”

Controllare ed attenersi sempre alle limitazioni d'uso riportate in etichetta.

- Si ricorda di tenere aggiornato il quaderno di campagna.

Per informazioni:

Rosina Marco Tel: 0141-380408 marco.rosina@coldiretti.it

14100 Asti – C.so F. Cavallotti, 41 – Tel 0141 38.04.00 – Fax 0141 35.51.38
Cap. Soc. € 13.737,57 (I. V.) – N. Reg. Impresa AT 2000/2041 – R.E.A. 99537 – C.F. / P.IVA 01238160053

CANELLI: Via Cassinasco,11/13 - Tel. 0141/823590 • CASTELNUOVO D.B.: Via Viglione, 18 -Tel. 011/9876863 • MONCALVO: P.zza C.Alberto, 25 - Tel. 0171/916100 • NIZZA M.TO: Cso Acqui,42/44 - Tel. 0141/721117 • SAN DAMIANO D'ASTI: Via Roma , 23 - Tel. 0141/971000 • VESIME: P.zza Vittorio Emanuele II, 3 - Tel. 0144/859801 • VILLANOVA D'ASTI: Via O. Blandino,19 - Tel. 0141/946639