

VITE: avviso n°05 del 01/06/2022

STADIO FENOLOGICO: FINE FIORITURA - ALLEGAGIONE

PERIODO DI RIFERIMENTO: 01-06-2022 / 10-06-2022

Le previsioni indicano possibili passaggi temporaleschi a partire da domenica che potrebbero proseguire nei giorni successivi.

PERONOSPORA

Ad oggi, in rari casi sono stati riscontrati sintomi di infezioni. Si consiglia di tenere monitorate le previsioni meteo, vista l'alta variabilità che caratterizza gli eventi temporaleschi suddetti, intervenendo prima delle eventuali piogge e comunque entro la fine della settimana. Si consiglia di intervenire impiegando uno dei seguenti p.a.

FOLPET da preferirsi dove ha grandinato o dove la fase fenologica sia la fine della fioritura (max 4 interventi complessivi tra folpet, ditianon e fluazinam)

RAME impiegabile dove i grappoli sono completamente allegati (max 4 kg/anno di rame metallo)

FOSFONATO DI POTASSIO (max 5 interventi, max 8 trattamenti complessivi tra fosfonati e fosetil-Al)

FOSFONATO DI DISODIO (max 6 interventi, max 8 trattamenti complessivi tra fosfonati e fosetil-Al)

OIDIO

In numerosi vigneti si riscontrano sintomi del patogeno su foglia. La fase fenologica risulta particolarmente delicata e le condizioni climatiche favoriscono il progredire della malattia. Si consiglia di scoprire il più possibile le uve nel corso delle operazioni di gestione del verde, in particolare sul lato non esposto al sole pomeridiano. Si consiglia di intervenire con uno dei seguenti p.a.

FLUXAPYROXAD (max 2 interventi annui complessivi tra fluxapyroxad e boscalid)

TETRACONAZOLO (max 3 interventi complessivi con prodotti appartenenti al gruppo IBE)

SPIROXAMINA (max 3 interventi annui)

METRAFENONE (max 3 trattamenti annui complessivi tra metrafenone e pyriofenone)

ZOLFO BAGNABILE

Nel corso della prossima settimana, se le condizioni climatiche sono favorevoli, si consiglia di intervenire con ZOLFO IN POLVERE

“Al fine di tutelare le api e gli altri insetti pronubi si ricorda quanto previsto dalla Legge Regionale 1/2019, Art. 96, comma 9. I trasgressori sono puniti con sanzioni fino € 1200,00.

Al fine di tutelare gli allevamenti apistici da sostanze tossiche, sono vietati i trattamenti antiparassitari con fitofarmaci ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi. I trattamenti sono, altresì, vietati se sono presenti secrezioni nettariifere extrafloriali su piante con presenza di melata o qualora siano in fioritura le vegetazioni sottostanti, tranne che si sia proceduto allo sfalcio di queste ultime ed all'asportazione totale delle loro masse, o si sia atteso che i fiori di tali essenze si presentino completamente essiccati in modo da non attirare più le api. I trattamenti specifici contro le malattie crittogamiche di colture erbacee, nonché contro le ticchiolature delle pomacee e le moniliosi delle drupacee possono venire effettuati con prodotti selettivi, anche durante le fioriture, solamente nei casi di necessità accertati dalla struttura regionale competente in materia fitosanitaria.”

Controllare ed attenersi sempre alle limitazioni d'uso riportate in etichetta.

- Si ricorda di tenere aggiornato il quaderno di campagna.

Per informazioni:

Rosina Marco Tel: 0141-380408 - 3316572135 marco.rosina@coldiretti.it

Tecnici di zona