



Coldiretti ASTI



Impresa Verde® ASTI

NOCCIOLO: avviso n° 1

Realizzato in collaborazione con AGRION

Giovedì 16/05/2024

TERRITORIO DI RIFERIMENTO: Asti e Provincia

AGGIORNAMENTO TECNICO

Eriofide: si consiglia di intervenire

Cocciniglia: valutare intervento sugli impianti in allevamento

Mal dello stacco: asportare le branche colpite

Batteriosi: ove necessario contenere gli attacchi

Afidi: evitare trattamenti insetticidi in presenza di melata

ERIOFIDE

Le forme mobili dell'acaro presentano una situazione leggermente differente in base alle località ed all'esposizione dei versanti, ci troviamo al momento nella fase tra piena e fine migrazione, **si consiglia di proseguire con i monitoraggi visivi** e di proseguire gli interventi di difesa fino a giugno.



Tipologia di intervento:

- ➔ CONVENZIONALE: olio minerale, zolfo, clofentezine
- ➔ BIOLOGICO: olio minerale, zolfo, sali potassici di acidi grassi, maltodestrina, olio di arancio

N.B. OLIO MINERALE, non applicare con temperature inferiori a 5°C e distribuire su vegetazione asciutta. Posticipare la distribuzione di formulati contenenti zolfo di almeno 21 giorni.

COCCINIGLIA

In questa fase si ha in campo la presenza di scudetti adulti, **si consiglia di contattare il proprio tecnico al fine di valutare se effettuare, nei soli impianti in allevamento, un intervento a fine schiusura delle uova e migrazione delle neanidi.** Per gli impianti in produzione, data l'elevata copertura fogliare, si consiglia di rimandare i trattamenti ad inizio caduta foglie quando gli stadi giovanili migrano dalle foglie ai rametti e sono maggiormente raggiungibili con i trattamenti.

Tipologia di intervento:

- ➔ CONVENZIONALE: olio minerale, sali potassici di acidi grassi, maltodestrina
- ➔ BIOLOGICO: olio minerale, sali potassici di acidi grassi, maltodestrina, olio di arancio

N.B. OLIO MINERALE, non applicare con temperature inferiori a 5°C e distribuire su vegetazione asciutta. Posticipare la distribuzione di formulati contenenti zolfo di almeno 21 giorni.

MAL DELLO STACCO: *Cytospora corylicola*

Proseguono le segnalazioni di evidenti attacchi di citospora o mal dello stacco.

Si consiglia di proseguire con i rilievi per asportare le branche colpite e di negli appezzamenti con elevata presenza intervenire con prodotti rameici.

Tipologia di intervento:

- ➔ CONVENZIONALE: rameici
- ➔ BIOLOGICO: rameici

BATTERIOSI

Segnalata presenza a macchia di leopardo. **Ove sia necessario contenere gli attacchi della batteriosi consiglia di contattare il tecnico di riferimento per concordare periodo e strategia da adottare.** Tipologia di intervento:

- ➔ CONVENZIONALE: rameici, acibenzolar-s-metile
- ➔ BIOLOGICO: rameici

AFIDI

Laddove vi fossero importanti infestazioni di afidi con conseguente produzione di melata si consigliadi contattare il tecnico di riferimento per valutare la più corretta tipologia di gestione (es. lavaggi). Si ricorda

di evitare trattamenti insetticidi laddove vi fosse presenza di melata, al fine di tutelare i pronubi impollinatori.

NOTA BENE

PRODOTTI AUTORIZZATI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Possono essere utilizzate tutte le sostanze attive previste dall'Allegato I del Reg. 2021/1165 del 15 luglio, comprese le autorizzazioni temporanee per uso eccezionale, a condizione che siano regolarmente autorizzati in Italia e solo nel caso in cui le avversità bersaglio siano presenti nelle relative schede di coltura.

L'uso dei prodotti biologici non è soggetto ai limiti del numero massimo di trattamenti previsti per le singole avversità nelle schede culturali, se non diversamente specificato, e sempre nel rispetto di quanto indicato in etichetta.

Il Tecnico

Maurizio Gucciardo