

VITE: avviso n° 6 del 06/06/2025

**In ottemperanza al C.S.R. 2023-2027 SRA01
Produzione Integrata**

STADIO FENOLOGICO: Allegagione - Mignolatura

PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 06/06/2025 al 13/06/2025

FLAVESCENZA DORATA

TRATTAMENTI INSETTICIDI OBBLIGATORI anno 2025 CONTRO *Scaphoideus titanus*
(Ordinanza Ministeriale n. 4 del 22 giugno 2023)

TRATTARE SOLO A CONCLUSIONE DELLA FIORITURA

PRIMO TRATTAMENTO	DAL 10 giugno AL 17 giugno
Deve essere effettuato con un insetticida a scelta tra i seguenti principi attivi	Acetamiprid, Flupyradifurone, Sulfoxaflor

E' obbligatorio asportare la vegetazione sintomatica o capitizzare le piante malate dopo aver trattato con l'insetticida e trascorso il tempo di rientro (almeno 48 ore): questo serve per togliere la fonte di fitoplasma che rende infettivo l'insetto vettore (scafoideo).

Modalità di esecuzione dei trattamenti insetticidi obbligatori

- spollonare, cimare e sfoltire la vegetazione almeno due o tre giorni prima del trattamento;
- sfalciare o asportare, due giorni prima del trattamento, la vegetazione tra i filari nel caso di presenza di fioriture spontanee, al fine di preservare le api e gli insetti pronubi;
- verificare la taratura e il buon funzionamento dell'attrezzatura impiegata per il trattamento;
- per contenere la deriva non trattare con vento dalla velocità superiore a 3 m/s pari a circa 11 km/h;
- bagnare bene tutta la vegetazione trattando entrambi i lati del filare, compresi polloni e ricacci lungo il fusto; trattare passando in tutti i filari;
- utilizzare volumi di acqua adeguati (minimo di 400 lt/ha) ed eseguire i trattamenti ad una velocità di avanzamento utile a consentire al prodotto utilizzato di raggiungere la pagina inferiore delle foglie (velocità massima 8 km/h così come da linee guida nazionali);
- correggere il pH dell'acqua di soluzione, che deve essere sempre inferiore a 7;
- evitare, se possibile, la miscela con altri prodotti fitosanitari, concimi, etc;
- per i prodotti fotolabili (es. piretro) effettuare il trattamento nelle ore serali o notturne

SALVAGUARDIA DEGLI INSETTI PRONUBI

(Legge regionale 22/01/2019, n. 1)

- Divieto trattamenti insetticidi in fioritura;
- Sfalcio e appassimento/asportazione della vegetazione sottostante nel caso di presenza di fioriture spontanee due giorni prima di eseguire i trattamenti insetticidi;
- Evitare fenomeni di deriva (non trattare in presenza di vento).

VIGNETI ADIACENTI AD AREE FREQUENTATE DA GRUPPI VULNERABILI

(punto A.5.6 del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari)

Per i vigneti situati a distanze comprese tra i 10 e i 30 metri (al di sotto dei 10 metri non sono possibili trattamenti) da aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili (quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili ed aree verdi di plessi scolastici, parchi gioco, strutture sanitarie), devono essere adottati i seguenti accorgimenti:

- distribuire la miscela verso l'interno del vigneto;
- utilizzare coadiuvanti antideriva;
- non utilizzare cannoni per la distribuzione della miscela insetticida;
- segnalare preventivamente alla popolazione l'esecuzione dei trattamenti con adeguata cartellonistica;
- trattare nelle ore di minor frequentazione.

SANZIONI

CHIUNQUE NON RISPETTI GLI OBBLIGHI RELATIVI ALL'ESECUZIONE DEI TRATTAMENTI INSETTICIDI OBBLIGATORI E' PUNITO CON LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DA 1.000 A 6.000 EURO (D.Lgs. 19/2021 art. 55 c.15)

PERONOSPORA

Si consiglia di mantenere coperta la vegetazione con prodotti rameici.

Se la situazione meteorologica peggiorasse contattare il servizio tecnico.

OIDIO

Considerando la notevole umidità relativa che favorisce lo sviluppo del fungo, si consiglia di eseguire un trattamento a base di:

ZOLFO BAGNABILE

Laddove vi sia pressione del patogeno abbinare

PENCONAZOLO o TETRACONAZOLO o MEFENTRIFLUCONAZOLO
(massimo 3 trattamenti/anno).

AZOXYSTROBIN o PYRACLOSTROBIN o TRIFLOXYSTROBYN
(massimo 3 trattamenti/anno)

PROQUINAZID o BUPIRIMATE o PYRIOFENONE
(massimo 2 trattamenti/anno).

METRAFENONE o PYRIOFENONE
(massimo 3 trattamenti/anno)

FLUXAPYROXAD (massimo 2 trattamenti/anno) oppure
BOSCALID (massimo 1 trattamento/anno)

NOTE:

- **Si raccomanda il confronto con il proprio tecnico di riferimento in particolare per le Aziende aderenti alla Produzione Integrata. I tecnici sono a disposizione per verificare altre strategie di lotta.**
- **Controllare ed attenersi sempre ad eventuali ed ulteriori limitazioni d'uso riportate in etichetta.**
- **Si ricorda di tenere aggiornato il quaderno di campagna.**
- **Si ricorda nelle miscele estemporanee sono ammessi al massimo 2 principi attivi ai quali è possibile aggiungerne uno a scelta tra i seguenti: Rame, induttori sistemici (Fosetyl Al – Fosfito di Potassio – Fosfonato di Disodio) e Zolfo Bagnabile.**
- **Non superare il riferimento medio di 4 Kg/ettaro/anno di Rame metallo.**

Per informazioni:

Ravizza Vittorio Tel: 366 1577501 vittorio.ravizza@coldiretti.it

Tecnici di zona

Asti: – C.so F. Cavallotti, 41 - 14100 Asti – Tel 0141 38.04.00 – Fax 0141 35.51.38
Cap. Soc. € 13.737,57 (I. V.) – N. Reg. Impresa AT 2000/2041 – R.E.A. 99537 – C.F. / P.IVA 01238160053

CANELLI: Via Cassinasco, 11/13 - Tel. 0141 823590 • CASTELNUOVO D.B.: Via Viglione 18 -Tel. 011 9876863 • MONCALVO: P.zza C. Alberto, 25 - Tel. 0141 916100 •
NIZZA M.TO: C.so Acqui, 42/44 – Tel. 0141 721117 • SAN DAMIANO D' ASTI: Via Roma, 23 - Tel. 0141 971000 • VESIME: P.zza Vittorio Emanuele II, 3 - Tel. 0144 859801 •
VILLANOVA D'ASTI: Via O. Blandino, 19 - Tel. 0141 946639