



Coldiretti



Impresa Verde® ASTI

**In ottemperanza al P.S.R. 2023_2027 SRA01
Produzione Integrata**

Avviso n° 10

MERCOLEDÌ 16/07/2025

PERIODO DI RIFERIMENTO DALL' 16 AL 26 Luglio 2025

TERRITORIO DI RIFERIMENTO: Asti e Provincia

TUTELA DEI PRONUBI

La fioritura dell'albicocco è in corso e in settimana inizieranno quelle del susino (cv Angeleno) e pesco. Per questo motivo occorre porre la massima attenzione alla tutela delle api e degli altri insetti pronubi evitando trattamenti insetticidi/fungicidi e erbicidi dannosi.

Di seguito si riporta il testo della legge regionale per la tutela delle api:

1. Il comma 9 dell'articolo 96 della l.r. 1/2019 è sostituito dal seguente:

"9. Per tutelare le api e gli altri insetti pronubi, è fatto divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari insetticidi ed acaricidi durante le fioriture delle colture agrarie, ornamentali e della vegetazione spontanea. Tale divieto è esteso ai prodotti fungicidi, diserbanti e ad altri prodotti fitosanitari e biocidi, qualora riportino nelle etichette indicazioni di pericolo e tossicità per le api e gli altri insetti pronubi. Per periodo di fioritura si intende l'intervallo dall'inizio dell'apertura dei petali alla caduta degli stessi.".

2. Dopo il comma 9 dell'articolo 96 sono inseriti i seguenti:

"9 bis. Il divieto di cui al comma 9 è fatto valere anche per i trattamenti effettuati in presenza di secrezioni nettarifere extrafiorali e di melata, nonché in presenza di fioriture della vegetazione spontanea sottostante o contigua alle coltivazioni. Tale divieto decade se si provvede mediante preventivo interramento, trinciatura o sfalcio con successivo disseccamento del materiale vegetale, in modo che non risulti più attrattivo per le api e gli altri pronubi.

CIMICE ASIATICA

Le catture dell'insetto nelle trappole a feromone di aggregazione sono in lieve aumento rispetto alla scorsa settimana. **Al momento non si segnalano danni sui fruttiferi. Si raccomanda di monitorare con attenzione gli appezzamenti più a rischio a partire dalle file perimetrali e non tralasciando la parte alta della pianta. Si consiglia inoltre di gestire correttamente il cotico erboso per non favorire l'eventuale risalita dell'insetto alla chioma.**

MELO

Glomerella

Si segnala la presenza dei primi sintomi limitatamente ai testimoni non trattati e alcuni meleti a forte rischio. **Si ricorda in questa fase di arieggiare la chioma (potatura verde), tagliare l'erba sia nel sottofila sia nell'interfila e irrigare in base alle esigenze idriche delle piante evitando irrigazioni a scorrimento e sovra irrigazioni.**

Colpo di fuoco batterico

La malattia continua ad essere segnalata. Si consiglia di procedere con le necessarie operazioni di rimondatura delle parti infette. Eseguire trattamento rameico terminati i tagli.

Carpocapsa

Il modello matematico conferma l'inizio della fase larvale di II GEN (in particolare nelle zone anticipate Nizza Monferrato, Saluzzo ecc). Per quanto riguarda la strategia di difesa si consiglia di:

IN CONFUSIONE: continuare con i controlli visivi ed intervenire solo al superamento della soglia critica (8 frutti colpiti ogni 1000 controllati) con un larvicida.

FUORI CONFUSIONE (strategia di difesa non consigliata) e MELETI IN CONFUSIONE AD ELEVATO RISCHIO: si consiglia di programmare nei prossimi giorni l'intervento larvicida (emamectina benzoato ecc).

Eulia

Il volo di II GEN è in conclusione (fase larvale in corso). **Al momento non si segnala la presenza di danni.**

Afide lanigero

L'aumento delle temperature ha favorito l'attività dell'*Aphelinus mali* in tutti i meleti colpiti dal fitofago. **Pertanto, si consiglia di evitare qualsiasi trattamento insetticida impattante che andrebbe a limitare l'attività dell'utile.**

PERO

Ticchiolatura (inf. secondaria)

Psilla

Tutelare l'attività dell'utile *Anthocoris nemoralis* che è dato in aumento anche nei pereti colpiti.

PESCO

Sharka

Presenza diffusa della problematica. Continuano le segnalazioni di sintomi sui frutti in raccolta.

Monilia

Valgono le indicazioni riportate nei precedenti avvisi. Mantenere i frutti delle varietà in maturazione adeguatamente protetti.

Cydia molesta

Ad oggi non si segnalano danni ascrivibili al carpofago. Continuare a monitorare le produzioni in maturazione e raccolta. **Nessun trattamento specifico necessario se non negli impianti in fase allevamento laddove è necessario proteggere i giovani germogli in fase di accrescimento.**

Tripidi (Nettarine)

Si segnala la presenza di sintomi come già indicato nei precedenti avvisi.

Cocciniglia a barchetta (Lecanio) - Cocciniglia cotonosa (P. comstocki)

Si segnala la presenza di melata sulle piante colpite da lecanio. Come già indicato nei precedenti avvisi, in casi di gravi infestazioni effettuare lavaggi per limitare l'accumulo di melata. Continuare a monitorare le produzioni in raccolta.

Forficula

L'attività dell'insetto è in corso e al momento non si segnalano particolari criticità.

SUSINO

Cydia funebrana

Il modello matematico (Regione Piemonte) conferma la presenza delle larve di III GEN. **Per quanto riguarda la strategia di difesa, laddove necessario, programmare il trattamento con un prodotto ad azione larvicida (emamectina benzoato ecc).**

Moria del kiwi

Sintomatologia in aumento. **Negli impianti ancora produttivi evitare sovra irrigazioni.**

Per informazioni tel. 366-1577501; mail: vittorio.ravizza@coldiretti.it

Via Falicetto, 24 - 12030 Manta (CN) - fondazioneagricolturapiemontese@legalmail.it

Il tecnico frutticolo

Vittorio Ravizza

ASTI: C.so F. Cavallotti, 41-Tel. 0141/380400 – Fax 0141/ 355138

Cap. Soc. € 13.737,57(I. V.) – N. Reg. Impresa AT2000/2041 – R.E.A. 99537 – C.F. / P.I.01238160053

CANELLI: Via Cassinasco,11/13 – Tel. 0141/823590 – **CASTELNUOVO DON BOSCO:** Viale Europa,12 – Tel. 0141/9876863 –

MONCALVO: P.zza Alberto,25 – Tel. 0141/916100 – **NIZZA MONFERRATO:** C.so Acqui,42/44 – Tel. 0141/721117 – **SAN DAMIANO D'ASTI:** Via Roma, 23 – Tel. 0141/971000 –

VESIME: P.zza V. Emanuele II, 3 – Tel.0144/859801 – **VILLANOVA D'ASTI:** Via O. Blandino, 19 – Tel. 0141/946639

